



**MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE**  
**AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA**  
**OFICIUL FITOSANITAR GORJ**

Bd. Ec Teodoroiu, nr. 521  
Tg.Jiu, Jud. Gorj

tel/ fax 0253249043  
e-mail :dfggorj@yahoo.



**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**Nr .11 din 18. 04.2018**

**„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”**

Conditiiile climatice din ultimele zile pot favoriza aparitia si dezvoltarea bolilor si daunatorilor care pot cauza pierderi importante in pomicultura la speciile din grupa :

**SAMBUROASE**

**Boli: monilioza (Monilinia spp.) ciuruire (Coryneum beijerynchii ),patarea rosie ( Polystigma rubrum ),basicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans ).**

**Daunatori : viespea prunelor (Hoplocampa spp. ),omizi defoliatoare (Operopthera brumata si Erannis defoliaria ) afide (Aphis spp.), acarieni.**

Pentru prevenire si combatere se recomanda se recomanda executarea tratamentului -I - la Hoplocampa spp. **dupa criteriul biologic in perioada preovipozitara (-depunerea primelor oua la baza caliciului floral )numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:**

**-boli infectie secundara si prezenta daunatorilor**

Se recomanda folosirea unuia din produsele de protectia plantelor sau amestecurile de ppp. de mai jos:

- DITHANE M45 =0,20 % + CALYPSO 480 SC =0,02% sau
- BOUILLE BORDELAISE WDG =0,5% + M AVRIK 2 F = 0,05(0,5 l/ha la 1000 l/ha ) sau
- ACUPRAL 50 PU =0,02% + KARATE ZEON =0,015 %sau
- DITHANE NEOTEC 75 WG =0,20 % + MOVENTO 100 SC =1,875 l/ha in 1000 l apa)

**Produse protectia plantelor selective pentru albine CALYPSO 480 SC SI MAVRIK 2 F**

Cand sant gasiti ca densitate de 4-5 acarieni/frunza sau 7-10 acarieni pe inflorescenta si peste ac. densitate atunci se foloseste un acaricid :

**MILBECKNOK =0,05 % sau SAFRAN 1,8 EC =1-1,5 l/ ha.**

Perioada optima de tratament dupa criteriul fenologic atunci cand 40-15% din petale s-au scuturat iar tratamentul al-II-lea la 8-10 zile de la tratamentul efectuat la scuturarea a 10-15 % din petale.

Fermierul trebuie sa anunte Primaria si crescatorii de albine pe o raza de 3 km de locul unde se executa tratamentul.

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfdf.ro>, apoi tasta la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html>.Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completeate cu Protocolul de colaborare nr 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 )privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu p.p.p**

**Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa detina:**

**Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare dupa urmatoorul model:**

Data efectuării tratamentului (an, luna, ziua)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitate Utilizate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1) )

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii .

INTOCMIT  
Ing. UNGUREANU CONSTANTINA

