



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Bd. Ec Teodoroiu, nr. 521

Tg.Jiu, Jud. Gorj

tel/ fax 0253249043

e-mail : dfggorj@yahoo.com



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.12 din 18.04.2018

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca ”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SEMINTOASE(MAR,PAR,GUTUI)

Boli:rapan(Venturia spp.),fainare (Podosphaera spp.,monilioza (Monilinia spp.),patarea alba a frunzelor (Mycosphaerella spp.)

Daunatori :viespea merelor (Hoplocampa spp.) omizi defoliatoare-cotarul verde și brun (Operopthera b.si Erannis defoliaria),afide (Aphis spp.),inelarul (Malacosoma neustria),psilide (Psylla spp.) și acarieni.

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului -I - la Hoplocampa spp. după criteriul biologic în perioada preovipozitară (–depunerea primelor ouă la baza caliciului floral) numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

-boli infectie secundara si prezenta daunatorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele de protecția plantelor sau amestecurile de ppp. de mai jos:

- ZATO 50 WG =0,01 % + CALYPSO 480 SC =0,02 % sau
- SHAVIT F 72 WDG =0,2% + ACTARA 25 WG =0,15 kg /ha sau
- MACCANI =0,15%(2,250 kg/ha) + MAVRIK 2F = 0,05 % sau
- TOPSIN 70 WDG =0,07 %(1,050kg/ha)/HA) = 0,14% +LUNA EXPERIENCE =0,75 l/ha

Produsele de protecția plantelor selective pentru albine :CALYPSO 480 SC și MAVRIK 2F .

Când sunt găsiți ca densitate de 4-5 acarieni /frunza sau 7-10 acarieni pe inflorescență și peste ac. densitate atunci se folosește un acaricid :

MILBECKNOK =0,05 % sau SAFRAN 1,8 EC =1-1,5 l/ ha.

Perioada optima de tratament dupa criteriul fenologic atunci cand 10-15% din petale s-au scuturat iar tratamentul al-II –lea la 8-10- zile.de la trat I .Fermierul trebuie sa anunte Primaria si crescatorii de albine pe oraza de 3 km de locul unde se executa tratamentul.

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :http://www.madr.ro/ro /fitosanitar.html-https: //aloe.anfdf.ro, apoi tasta la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, p cele de sanatate si securitate in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:http://www.madr.ro/ norme –de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.**

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină: Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare dupa urmatorul model:

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Și locul unde este situat terenul	Timpul aplicari i	Tratamentul efectuat					Nume, Prenum e pers. respons a- bile de efect. tratame nt. Semnat ura	Data incep erii Recol tarii produ sului agric ol	Nr. s Data Docu men tului prin care s-a dat in cons m popu lației
			Agent ul de daunar e: Boli/ Dauna tori/ buruie ni	Denu- mirea Ppp folosit	Doza Omo- logata /doza fola- sita	Su- pra- fata (ha)	Cantit . Utili- zate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

INTOCMIT
ING.UNGUREANU CONSTANTINA

